

Link do produktu: <https://www.mugga.pl/mugga-ikarydyna-25-spray-na-kleszcze-i-komary-p-34.html>

Mugga Ikarydyna 20%. Na kleszcze i komary

Cena	56,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00101/2018
Kod EAN	5903933031019
PKWiU	20.20.19.0
Ilość w opakowaniu	75 ml
Substancja czynna	Ikarydyna - 200 g/kg

Opis produktu

Skuteczny środek na kleszcze Mugga 20 % ikarydyna

Wersja 2023 z nowym aplikatorem

Produkt w postaci płynu przeznaczony do odstraszenia kleszczy. Do użytku zewnętrznego. Maksymalna ochrona przed kleszczami do 8h. Do użycia na skórę i ubrania. Nie barwi ubrań i posiada przyjemny zapach.

Produkt przeznaczony do użycia w rejonach, gdzie występuje wysokie ryzyko wystąpienia groźnych chorób przenoszonych przez kleszcze jak borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Szczególnie skuteczny w rejonach o zwiększonej obecności kleszczy jak gęste lasy, parki, obszary trawiaste.

Nie stosować poniżej 3. roku życia.

Dla dzieci poniżej 6. roku życia stosować 1 x dziennie, w przypadku dzieci powyżej 6. roku życia produkt może być stosowany 2 x dziennie.

Zalecana dla:

- Ogrodników i osób pracujących na roli
- Myśliwych, wędkarzy czy leśników
- Żołnierzy na misjach i innych służb mundurowych
- Osób, które wykonują pracę w warunkach zalesionych.
- Paintballowców i Survivalowców
- Młodzieży powyżej 18 roku, uczestniczącej w koloniach, obozach i wyjazdach typu **zielona szkoła**

**Czas działania:**

- klimat umiarkowany: do 8h godzin
- Klimat tropikalny: do 4 godzin

Sposób użycia:

Niewielką ilość preparatu należy rozpylić w odległości ok. 20 cm na skórę i ubranie. Aby nanieść na twarz, spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować na skórze. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Po użyciu zamknąć szczelnie pojemnik. Nie stosować na uszkodzoną, lub podrażnioną skórę i błony śluzowe.

Stosowanie na skórę:

1 raz dziennie - dzieci poniżej 6 roku życia

2 razy dziennie - dzieci powyżej 6 roku życia, oraz osoby dorosłe

Substancja aktywna: Ikarydyna 20%

Skład: 1-Piperidinecarboxylic acid 2-(2-hydroxyethyl)-1-methylpropylester(CAS 119515-38-7):200g/kg (Icaridin:20%), ethanol.

Pojemność: 75ml

Długość okresu przechowywania: do 3 lat (od daty produkcji)

Uwaga: przed użyciem należy przeczytać etykietę. Nie należy stosować równocześnie preparatów z DEET oraz ikarydyną, ponieważ mieszanka tych substancji jest toksyczna dla człowieka.

SKŁAD I SPECYFIKACJA OPAKOWANIA

Substancja czynna: ikarydyna – 200 g/kg.

Aplikacja formulacji: **Spray**

Forma aplikacyjna formulacji: Płyn

Opakowanie: Butelka

Pojemność: 75ml

Wymiary opakowania: 14 x 5 x 3 cm

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porad lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zwartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów zgodnie z krajowymi przepisami. Pierwsza pomoc: w przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Po narażeniu drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: spłukać skórę obficie wodą, skontaktować się z lekarzem.

SKŁAD: 1-Piperidinecarboxylic acid 2-(2-hydroxyethyl)-1-methylpropylester (CAS 119515-38-7) : 200g/kg (Icaridin: 25%), ethanol

Sposób użycia

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać rozpylonego produktu. Nanieść na odsłoniętą skórę, omijając okolice oczu i usta. Aby nanieść na twarz, spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować na skórze. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Po użyciu zamknąć szczelnie pojemnik. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.